

十二、傳染病的常見病徵

疾病種類	病徵
結膜炎（紅眼症）	眼紅、眼睛痕癢、眼淚水增加、不正常分泌
流感	發燒、頭痛、肌肉疼痛、流鼻水、咳嗽及喉嚨痛
水痘	發燒、疲倦、頭部及軀幹出現水泡
登革熱	發燒、頭痛、肌肉痛、神志不清
腸胃炎	腹痛、嘔吐、腹瀉、食慾不振、疲倦、發熱
手足口病	發燒、食慾不振、疲倦、喉嚨痛、口腔出現疼痛的水泡、手掌及腳掌出現紅點
乙型肝炎	發燒、黃疸、疲倦、食慾不振
人類免疫力缺乏病毒（HIV）感染及愛滋病（AIDS）	體重下降、發燒、盜汗過多、淋巴結腫脹、皮膚表面或底層、口鼻內或眼皮出現粉紅至帶紫色的斑點。許多受人類免疫力缺乏病毒感染的人可能很多年內都不會出現任何病徵
流行性感冒	發燒、咳嗽、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痛、疲倦
肺炎	發燒、疲倦、咳嗽、濃痰、痰中帶血、氣促
嚴重急性呼吸系統綜合症	發燒、疲倦、頭痛、發冷、咳嗽、氣促、呼吸困難、腹瀉
疥瘡	皮膚痕癢、局部皮膚出現紅疹、脫皮、腫塊、鱗屑等
結核病	持續性發燒、咳嗽、痰中帶血、疲倦、消瘦、盜汗

資料來源：衛生署 衛生防護中心 幼稚園預防傳染病指引

十三、學生染上傳染病的病假建議

傳染病	潛伏期 (日數)	建議病假 #
結膜炎 (紅眼症)	1-12	直至眼睛不再有異常分泌物
小兒麻痺症*	7-14	首現病徵起計至少 14 天
桿菌痢疾*	1-7	直至肚瀉已經停止及大便化驗顯示沒有該病菌 (須取三個各相隔至少 24 小時的大便樣本作化驗)
水痘*	14-21	約一星期或直至所有水疱變乾
霍亂*	1-5	直至證實不再受感染 (在完成抗生素療程 48 小時後, 須取三個各相隔至少 1 天的大便樣本作化驗)
白喉*	2-7	直至證實不再受感染 (在完成抗生素療程至少 24 小時後, 須有兩個各相隔至少 24 小時, 以拭子從咽喉及鼻咽取得的樣本, 而其培養物呈陰性化驗結果)
手足口病	3-7	直至所有水疱變乾或按醫生指示如致病原確定為 EV71 型腸病毒, 則直至所有水疱變乾後兩星期
甲型肝炎*	15-50	由首現黃疸病徵起計一星期或按醫生指示為準
麻疹*	7-18	出疹起計 4 天
腦膜炎雙球菌感染 (侵入性)*	2-10	直至完成清除病菌療程
流行性腮腺炎*	12-25	由呈現腫脹起計 9 天
德國麻疹*	14-23	出疹起計 7 天
猩紅熱*	1-3	由服用抗生素當日起計 5 天或按醫生指示為準
結核病*	不定	按醫生指示為準
傷寒*	7-21	直至至少連續有三個各相隔至少 24 小時取得的大便樣本, 化驗顯示沒有該病菌。(第一個大便樣本須於完成抗生素治療 48 小時後開始收集)
病毒性腸胃炎	1-10	直至最後一次肚瀉或嘔吐後起計 48 小時之後
百日咳*	7-10	直至已完成至少 5 天的抗生素療程或按醫生指示為準

以上建議只基於各種疾病的一般傳染期考慮。其他因素如病童的臨床情況亦在考慮之列, 主診醫生須以其專業判斷, 就病假的長短作最後決定。

* 法例規定, 此等傳染病須呈報衛生署衛生防護中心。

資料來源: 衛生署衛生防護中心 幼稚園預防傳染病指引